

太醫院經驗奇效良方大全

醫門秘傳奇效良方大全卷之六

附論

丹溪云夫濕者土之氣土者火之子故濕病多自熱生蓋火熱  
能生濕也或曰濕溫風濕寒濕矣未聞有所謂濕熱病者由

六氣之中濕熱為病十居八九故丙經云濕上潤而熱又云因  
於濕首如裹濕熱不攘大筋絎短小筋弛長絎短為拘弛長為  
痿或云溫熱在其中又云濕熱在其中此古人論其細微之處  
世之有病濕者或處卑濕或冒雨露或臥陰潤或衣濕汗俱能  
致言其病關節疼痛而煩肢體頑麻而重脉沉細者名曰濕痺  
其小便不利大便反快者當利其小便或身痛而煩脉沉而緩  
名曰重濕患一身盡痛發黃小便自利當燥陰土若肢體重著  
不可轉側額上微汗不欲去被身微腫或脉浮者名曰風濕是  
其風濕二氣相搏以致此治當微上發汗使風濕俱從汗出若

大發汗則風去而濕存兩脰逆冷胸腹滿頭目痛多汗妄言脉  
陽濡弱陰急小是名濕溫因傷濕而後傷暑者濕熱相搏而成  
此患不可發汗上則必不能言及耳聾不知痛癢乃是重暍濕  
家寒多者為痛為腫凡濕家不可大下下之額上汗出微喘小  
便利者不治下利不止者亦不治又有脾胃素弱內畜痰飲外  
冒風露痰濕相搏上衝心胃令人涎潮壅塞口眼喎斜半身不  
隨昏不知人与中風相似但脉沉澹或沉而細不可作中風治  
之謂其脾土好乾惡濕而被濕流相干則有是疾若作中風治  
之脾元愈虛痰濕愈盛必致危篤戴人論濕之證而以濕熱為  
原風寒為兼深得內經之旨也治濕得行則渙然而濕行而氣  
復散暫時開也殊不知濕得行則豁然而收也濕得衛也或從  
絨灸而得安者以其開通壅滯殊不知濕得開通而壅滯行如  
此亦用權者有可劫之病也要當分別上下內外之由自外而

感者或因霧露陰雨所客澡浴為風所閉淅水為寒所鬱汗出  
當風而快坐卧卑地清氣衰虛從下而起上為頭重鼻塞而煩  
表鬱則發寒熱身色如似薰黃着入骨節為重疼痛足趺浮腫  
其脉浮緩內經曰地之濕氣感則害人皮肉筋脉又云傷於濕  
者下先受之非外感所致乎大法腰已上宜汗腰已下宜利小  
便之分東垣云濕淫所勝助風以平之非風藥表散之謂乎經  
云濕上甚而熱治以苦溫佐以甘辛以汗為故而止此治上治  
外之法也自內而致者或因酒麵積多過飲湯液停滯臧物甘  
滑陳久燒炙香辛膏粱過度氣熱薰蒸濁液不行湧溢於中濕  
從內作重則發瘧強直霍亂吐利輕則痞膈中滿怠惰嗜卧沉  
重無力流瀼關節則煩疼注於絡脉屈伸不可轉則水性潤下  
氣不能煦滯於經絡發腫肉軟如泥按之不起其脉多沉潛內  
經曰溫氣在中又白脾惡溫非內致所生乎治法脾苦溫急食

苦以燥之又曰溫淫於內以苦燥之以淡泄之此溫自內成故宜燥宜利小便非表散所能去也此治內治下之法也今溫分上下內外蓋可知矣藥亦有所執乎金匱方以汗藥發溫者也古方以熱藥燥寒溫者也東垣以風藥勝溫者也河間以涼藥陷溫熱者也大率言淡滲之藥利溫者也諸家發明互相迥矣前人治病之證各有立論全在醫者識病或內因或外因或虛或實六淫七情所感的於何經受證以致之治之無不効矣

溫證通治方

除溫湯

治寒溫所傷身體重著腰脚痠疼大便澹泄小便

赤澁

半夏麴

炒半

厚朴

薑製

蒼朮

米泔浸

藿香

一

升

陳皮

去白

白茯苓

二

白朮

二

甘草

一

升

作一服水二鍾生薑七片紅棗一棰煎至一鍾食前服

羌附湯

治風濕相搏身體煩疼掣痛不可屈伸或身微腫

不仁

羌活

附子炮去

白朮

甘草

炙各二

作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服

滲濕湯

治坐卧濕地或為雨露所襲身重脚弱關節疼痛

發熱惡寒或多汗惡風或小便不利大腑溇泄

白朮

乾薑

白芍藥

附子

炮去

白茯苓

人參

桂枝

甘草

炙各

作一服水二鍾生薑五片紅棗一枚煎至一鍾不拘時服

清燥湯

六七月之間溫令大行子能令母突而熱旺溫熱

相合而刑夷踏腸故寒涼以救之燥金受溫熱之邪寒水

生化之源源絕則腎虧廢厥之病大作腰以下痿軟癱瘓

不能行走不正兩足欹側以此藥主之

蒼木

米泔浸  
一各半

五味子

什西

黃耆

黃連

白木

橘皮

白茯苓

去皮

當歸

各一

人參

生地黃

各七分

麥門冬

去心

神麴

炒

猪苓

黃蘗

酒炒

甘草

澤瀉

各半

柴胡

升麻

各三分

作一服水二鍾煎至一鍾食前服

木瓜虎骨丸

治寒濕合而成痺脚痛不仁疼痛少力足下

癱痛不能踏地腰腿筋攣不能屈伸及項背拘急手擘無

力耳內蟬鳴頭眩目旋脚氣行步艱難

木瓜

血竭

另研

沒藥

另研

虎胫骨

酒炙

木香

自然銅

醋炒

楓香

骨碎補

去毛

當歸

甜瓜仁

敗龜板

炙

肉桂

略一

安息香

酒熬

乳香

另研

地龍

去土

右為末酒糊丸如梧桐子大每服五六十丸食前溫酒下  
羌活勝濕湯 如脊痛項強腰似折而似拔上衝頭痛及足

太陽經不行

羌活

獨活

各二

藥本

防風

薏苡子

川芎

各一

甘草

炙半

作一服水二鍾煎至一鍾食後溫服如身重腰沉沉然乃

經中有濕熱也加黃蘗一錢附子半錢蒼朮二錢

四物附子湯

治風濕相搏骨節煩疼四肢拘急不得屈伸

附子

炮半

肉桂

二

白朮

三

甘草

一

作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服

防己黃耆湯

治風濕相搏客於皮膚四肢少力關節煩疼

防己

三

黃耆

四

白朮

三

甘草

一

作一服水二鍾生薑三片紅棗一箇煎至一鍾不拘時服



大橘皮湯

治濕熱內甚心腹脹滿水腫小便不利大便滑泄

橘皮

三升

滑石

四升

茯苓

半升

木香

檳榔

猪苓

澤瀉

白朮

各一

官桂

半升

甘草

三分

作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾食前服

天麻散

治風濕痺痛黃腫

天麻

全蝎

去毒各四升

熟地黄

木瓜

烏頭

當歸

各三升

牛膝

酒洗二升

乳香

沒藥

川山甲

炮

川芎

各一升

右為細末每服三錢空心用溫酒調服

導水丸

大黃二升

黃芩二升

滑石

四升

牽牛

頭末

去濕熱腰痛泄水溫腫痛久雨則加甘遂一兩

去遍身走注腫痛加白芥子一兩

退熱散腫毒止痛久早加朴硝一兩

散結滯通關節潤腸胃行滯氣通血脈加郁李仁一兩

去腰腿沉重加樟榔根一兩

右為末滴水丸如梧桐子大每服五十丸加至一百丸白

湯送下臨卧時服

### 除濕丹

治諸濕客傳腰膝重痛足胫浮腫筋脈拘急津液

凝澁便溺不利目赤癰疹疥癬走注脚氣盡皆治之

檳榔

甘遂

威靈仙

澤瀉

赤芍藥

葶藶

乳香

沒藥

牽牛五子

大戟炒三

陳皮去白

沒藥各一

右為末麵糊為丸如梧桐子大每服五六十九漸加八九

十先食前溫白湯送下服藥後忌酒溫麵二三日一方有

澤瀉陳皮各一两無亭蓼

參濕湯

治寒濕所傷身重腰冷如坐水中小便或澀或利

大便澹泄皆因坐卧濕處或因雨露所襲或因汗漬衣冷  
久久得之腰下重疼两脚痠痛腿膝或腫悉能除之

蒼术製

白术

甘草各二条

茯苓

乾薑炮各

陳皮

丁香各一条

右咬咀分作二貼每貼用水二鍾生薑三片棗一枚煎至  
一鍾食遠服

瓜蒂搐鼻法 治傷濕鼻塞頭疼

右用瓜蒂為末口含水搐一字入鼻中流出黃水効

白术酒 治中濕口噤不知人

白术一斗

右咬咀作一服用酒三盞煎至一盞頓服不飲酒水亦可

金砂流濕丸

治男子婦人雜證及風濕酒濕

海金沙

五升木通去皮

木香

郁李仁各一

澤瀉

白茯苓去皮

大黃略半

牽牛頭末

滑石各五

右為末滴水丸如梧桐子大每服五十丸至八十丸生薑

湯下忌溫麵

如小便不通燈草湯下

傷酒生薑湯下

酒疸食黃蘗湯下

痢疾高良薑湯下

婦人血氣不調當歸湯下

肢節疼痛溫酒下

心疼韭根湯下

膈氣枳實湯下

尋痛丸

治走注流濕已後宜用襲經絡除疼痛

機欄

燒存性穿山甲酥炙

當歸去蘆

乳香別研

沒藥

別研各木香半及

麝香別研

皂莢子仁炒二及

右為細末酒煮麵糊為丸如梧桐子大每服五十丸不拘時溫酒下或木瓜湯下

補骨脂丸 治溫傷內外衆疾俱作陽氣衰絕乳石補益之藥百端皆不應唐鄭相公為海南節度七十有五越地卑濕服諸藥不應原和七年有訶陵國船主李摩獻此方經七八日而覺應驗自爾常服其功神驗十年二月罷郡歸京錄方傳之

破故紙

針及東洗為細末

胡桃肉

去皮及研如泥

右胡桃肉泥入破故紙末更以好煉蜜和勻如飴盛磁器中旦日以溫酒化藥一匙服之不飲酒者以溫熱水化下彌久則延年益氣悅心明目補添筋骨但禁食芸薹羊血生附湯 治受溫腰疼痛

附子

生用

牛膝

酒浸

厚朴

製

乾薑

生用

白朮

茯苓

甘草

各二錢

杜仲

各半

右咬咀每服三錢水一盞半生薑三片棗一枚煎至八分

去粗食前服

七聖散 治風濕流注經絡間肢節緩縱不隨或脚膝疼痛不

能步履

續斷

獨活

防風

杜仲

草薢

牛膝酒浸

甘草

右各修事淨焙乾半兩為細末每服二錢溫酒調下

蒼朮散

治風濕常服壯筋骨健步

蒼朮

一片用藥米泔水浸過用竹刀刮去剝皮以童子小便浸半片無灰好酒浸半片

右浸至春五日夏三日秋七日冬十日取出蒼朮於淨地

上搗一坑以炭火煨坑紅去炭將浸蒼朮酒少便傾在坑

內却放蒼朮在坑內以瓦器蓋覆用泥封固經一宿取出  
蒼朮研為細末每服二錢空心鹽湯或酒調服常服除濕  
壯筋骨明目

乳香沒藥丸 治遠年近日風濕脚氣攻注脚膝或腫或疼筋

掌不能屈伸脚不能踏地及一切疼痛往來不已宜服

乳香 別研 沒藥 別研 骨碎補 去毛 五靈脂 去土

縮砂仁 白附子 甜瓜子 牛膝 酒浸

當歸 去蘆 乾木瓜 地龍 去土 木鱉子 各一

白牽牛 三及一

右為細末酒煮麵糊為丸如梧桐子大每服二十九溫木  
瓜湯下或溫酒亦可不拘時服

上馬丸 治寒濕臂痛腿疼筋骨諸疾

川烏 炮 木香 不見火 虎骨 酥炙 牛膝

杜仲

木瓜

當歸酒浸

敗龜板酥炙

自然銅醋淬黃耆蜜炙

白朮略一

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大每服三四十丸溫酒下  
治風寒濕痺麻木不仁粥法

右川烏生為末用香熟白米作粥半碗藥末四錢同米用  
慢火熬熟稀薄不要稠下薑汁一茶脚許蜜三大匙攪勻  
空心啜之溫為佳如是中濕更入薏苡仁末二錢增米作  
一中碗服此粥大治手足四肢不隨痛不能舉者有此證  
者預服防之左氏云風淫末疾謂四肢為四末也脾主四  
肢風邪客於肝則溼脾脾為肝剋故疾在末穀氣引風濕  
之藥徑入脾經故四肢得安此湯劑極有力予嘗製此方  
以授人服者皆驗

治脚轉筋

三



急伸脚將脚緊鈞向前其痛即止

輕脚丸 逐風去濕消腫行血止痛

白朮

赤茯苓

木猪苓

去皮

舶上面香

澤瀉

赤芍藥

紫蘇葉

葫蘆巴

枳實

麸炒

檳榔

桃仁

一及

雙仁

炒

地膚子

一及

右除桃仁別研外搗羅為細末入桃仁煉蜜和搗三五百

杵丸如梧桐子大每服三五十丸加至百丸空心紫蘇湯

下舊有寒濕之疾每發時不可忍呻吟之聲徹於外幾至

於死忽遇道人授此方繞服半料間或發作頻費減於前

時服盡全料痼疾遂瘳信而服之其驗如神

秘傳循經丸

治男子婦人兒童室女諸經絡風邪寒濕氣血

留滯流注作痛筋脉攣拳並皆治之常服亦可

川烏炮去 當歸酒浸 地龍去土 南星炮各

草烏去一兩 豆餅三兩 黑豆不以多少去皮 乾薑碎作餅子

乳香別研 沒藥別研各 大每服三十丸食後溫酒下

香木除眩湯 治感寒濕頭目眩暈

川芎二升 白朮三升 附子地一 甘草炙

官桂各一

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾食前服

太醫院經驗奇效良方卷之六

太醫院經驗奇效良方卷之七

燥門

附論

內經曰諸燥枯涸乾勁皴揭皆屬於燥乃陽明燥金肺與太陽之氣也故曰燥萬物莫熯乎火燥之爲病皆屬燥金之化然金卦本燥能令燥者火也夫金爲陰之主爲水之源而受燥氣寒水生化之源竭絕於上而不能灌溉周身營養百骸色乾而無潤澤皮膚滋生毫毛若有自來矣或大病而尅伐太過或吐利而亡津液或預防養生誤餌金石之藥或防勞致虛補塞燥劑食味過厚辛熱太多醇酒炙肉皆能偏助狂火而損害真陰陰中伏火日漸煎熬血液衰耗使燥熱轉甚爲諸病在外則皮膚皴揭在上則咽鼻焦乾在中則水液衰少而煩渴在下則腸胃枯涸津不潤而便難在手足則痿弱无力在脉則細瀋而微此皆陰血爲火熱所傷也原病式云風熱火同陽也寒燥濕同陰

也。又燥濕小異也。燥金雖屬秋陰而異於寒濕故反同其風熱也。火熱勝而金衰而風生則風能勝濕熱能耗液而反寒陽實陰虛則風熱勝於水濕而為燥也。凡人風病多因熱甚而風燥者為其兼化以熱為其主也。然陽實陰虛而風熱太甚以勝水濕因而成燥肝主於筋而風氣自甚又燥熱加之液還聚於胃膈則筋太燥也。燥金主於收斂勁切腎瀆故為病筋脈勁強緊急而口噤也。或病燥熱太甚而脾胃乾涸而成消渴者或風熱燥甚怫鬱在表裏氣平者善伸數欠筋脈拘急或時惡寒或筋惕而搐脈浮數而弦也。風熱燥鬱甚於裏故煩滿而或閉結也。及風癰之發作者由熱甚而風燥為其兼化從溢胃膈燥燥而痿痺昏冒僵仆也。凡此諸證皆由熱甚而生風燥各有異者由風熱燥各微甚不等故也。所謂中風或筋緩者因其風熱勝濕而為燥乃燥之甚也。然筋緩不收而痿痺故諸臍臂病痿皆屬

金肺乃燥之化也如秋深燥甚則草木痿落而不收病之象也  
是以手得血而能握足得血而能步夫燥之為病血液衰少而  
氣血不能通暢故其病也治法當以甘寒滋潤之劑故甘寒俱  
能生血又寒能勝熱陰得滋而火殺液得潤而燥除源泉下降  
精血上榮如是則氣液宣通由內神茂而外色澤矣內經治法  
燥者潤之非養血潤燥之謂歟世或有言風熱而燥誤以辛涼  
驅風苦泄之劑愈燥其液損之又損殊不知血衰致燥多招風  
象乃水火得侮金水之衰也風燥之疾當求其本治則不失矣

燥通治方

當歸潤燥湯

當歸

熟地黄

生地黄

大黃

桃仁泥

麻仁

甘草各一

升麻二升

紅花半升

右作一服水二鍾煎至一鍾空心熱服

導滯通幽湯 治大便難幽門不通上衝吸門不開噎塞不便

燥閉氣不得下治在幽門以辛潤之

當歸 桃仁泥各半 生地黃 熟地黃各二

升麻一 紅花 甘草各半

右作一服水二鍾煎至一鍾去粗調攪柳細末二升稍溫服

升麻瀉濕湯 治煙隔不通逆氣裏急大便不行

升麻 生地黃 熟地黃 蒼朮

青皮 黃柏 當歸各一 黃耆一

桃仁泥 槐子各五 甘草六分

右作一服用水二鍾煎至一鍾食前熱服

麻黃白水散 治大便秘不通小便赤黃渾身腫其色黃麻木

重如山沈困無力四肢痿軟不能卒動喘促唾清水白沫

如膠吐噦痰喘時燥熱發欲去衣頃更而過振寒頃額有  
時如冰頭旋眼黑目中溜火冷淚鼻不聞香臭少腹急痛  
當臍有動氣按之堅硬而痛

麻黃

三升 各一

吳茱萸

草豆蔻

厚朴

生甘草

各一 神翹

升麻

柴胡

白朮

蒼朮

茯苓

澤瀉

人參

黃耆

猪苓

桂枝

杏仁

黃柏

酒製

橘紅

各半

黃連

酒製

青皮

炙甘草

各三

右作一服用水二鍾入麻黃先煎令沸去沫再入諸藥同  
煎至一鍾食遠稍熱服一方有白豆蔻半錢

潤腸丸

治脾胃伏火大便秘澁或乾燥塞不通全不思食乃

風結秘血結秘皆令閉塞以潤燥活血疎風自然通快

麻子仁

桃仁各一及 羌活

當歸尾

太黃

煨各半及

石除麻仁桃仁別碾如泥外餘藥研為細末和勻煉蜜丸如梧桐子大每服三五十丸空心白湯送下

活血潤燥丸

治大便風秘不通常燥結

當歸

防風各三

大黃濕熱

羌活各一及

桃仁

二及湯炮去皮尖別研如泥

麻子二及半別研如泥

皂角仁

去皮穢存性一及半其性得溫則滑溫滑則燥結自除用之勿誤

右除桃仁麻仁別研外其餘藥研為末和勻煉蜜為丸如梧桐子大每服五十九三兩服後大便日久不能結燥也以磁器盛之勿令見風

神功丸

大黃煨

訶子肉

麻子仁

別研人參去蘆各一及



右為細末入麻仁泥和勻煉蜜丸如梧桐子大每服三十丸溫水下或酒或米飲下食後臨卧如大便不通加服

脾約丸

麻仁一乃二

枳實麩炒

厚朴去花

芍藥各二

大黃蒸四

杏仁去皮尖炒黃

右為細末煉蜜丸如梧桐子大每服二十丸臨卧溫水下

麻仁丸

郁李仁

別破去麻子仁別研二味

大黃二乃半

枳殼炒去

防風去芦

乾山藥各七檳榔半乃

羌活

木香各五

右為細末入別研藥和勻煉蜜丸如梧桐子大每服二十丸至三十丸食後溫湯下加牽牛滑石尤妙

潤體丸

郁李仁

大黃

桂心

黑牽牛

當歸

黃蘗

肥上並生用各半斤

輕粉 少許

右為細末滴水丸如梧桐子大每服三十丸至四十丸用溫湯或生薑湯送下

導氣除燥湯

治小便閉澀不通乃血澀致氣不通而竅澀也

知母 酒製

澤瀉

為末

茯苓 去皮

滑石

末炒黃色各二斤

黃蘗 酒製

右和勻作一服用水二鍾煎至一鍾空心稍熱服如急閉

不拘時候服

太醫院經驗奇効良方卷之八

火門

附論

內經曰六氣所入風寒在下燥熱在上濕氣在中惟火遊行其間能貫皆癸上下之病者多乎動而為病者惟火也病機論云五火為病內格嘔逆食不得入是有火也諸熱瞀瘳皆屬於火熱氣甚則濁亂昏昧也經所謂病筋脉相引而急名曰瘳故俗謂之搐是也諸禁慄鼓如喪神守皆屬於火禁慄驚風如喪神守悸動怔忡皆熱之內作故治當以制火之劑其神守血榮自愈也諸逆衝上皆屬於火衝攻也火氣炎上故嘔湧溢食而不下也諸躁狂越皆屬於火胃火則四肢實而能登高也故四肢者諸陽之本經所謂陰不勝陽則脉流薄疾乃狂是以陽勝則使妄言罵詈不避親疎神明之亂也治之以補陰瀉陽奪其食則病已諸証皆屬於火然火也其中有君相二火之名焉是

以丹溪云君火人火也相火天火也火內而外陽主乎動者五行之中惟火有二雖然尤不止於是也故凡動皆屬於火以名而言形質相生配於五行故謂之君以位而言生於虛無之位稟命因其動而可見故謂之相火主生物故恒於動人有此生亦恒於動其有所恒於動者皆相火助之為也見於天者出於龍雷之氣出於海者則水之氣也具於人者寄於肝腎二部肝屬木而腎屬水也膽者肝之腑膀胱者腎之腑心胞絡者腎之配三焦以焦言而下焦同肝腎之分皆陰而下者也天非此火不能生物人非此火不能有生何間深察內經之意言之詳病喘嘔吐酸暴注下迫轉筋小便渾濁腹脹大鼓癰疽瘍瘡瘰癧結核頰下霍亂瘡悶腫鼻塞衄血溢血泄淋閉身熱惡寒戰慄驚惑悲笑譫妄衄血汚此皆少陰君火之熱乃真心小腸之氣所為也若腎寒暴瘖胃味躁擾狂越罵詈驚駭附腫疼

酸氣逆上衝禁慄如喪神守瘡瘍喉痺耳鳴及舌嘔湧溢食不  
下目昧不明暴注憊暴病暴死此皆少陽相火之熱乃心胞  
絡三焦之氣所為也君火之氣經以暑與熱言之相火之氣經  
以言之其暴悍酷烈有甚於君火者也相火易起五性厥陽之  
火相煽則妄動矣火起於妄變化莫測無時不有煎熬真陰陰  
虛則病陰熱則死東垣謂相火為元氣之賊也又曰相火與元  
氣不兩立一勝則一負曰然則如之何可使無勝無負乎曰神  
癸之矣五性感動而万事出五者之性為物所感不能不動動  
者即內絪五火也古人以中正仁義而主靜朱子以道心常為  
一身之主而人心每斥命焉此善處乎火者人心听命於道心  
而又能主之以靜比五火寂然不動而相火者惟有裨造化而  
為生生不息之運用何賊之有曰謂相火之外又臟腑厥陽之  
火此經所謂一水不勝二火之大出於天造厥陽此經所謂一

水不勝五火之大出於人焉所謂五臟各有火夫五志激之其  
火隨起蓋大怒則火動此皆少陰君火之熱乃真心小腸之氣  
所為也若大怒則火起於肝醉飽則火起於胃房勞則火起於  
腎悲哀動中則火起於肺心火自焚則死矣且火出於臟腑為  
病之狀曰諸風掉眩屬於肝火之動也諸氣膈鬱病痿屬於肺  
火之升也諸溫腫滿屬於脾火之勝此皆相火少陽相火之熱  
乃心胞絡三焦之氣所為也故為諸病諸痛癢瘡皆屬於心火  
之用若少陽病內為癰瘕太陽病時眩仆少陰病腎暴瘡胃  
不知人諸熱瞋瘵以屬火少陽惡寒鼓慄瘧病振寒少陰病洒  
淅惡寒振慄厥陰病洒淅振寒若諸振鼓慄如喪神守皆屬火  
也原病式曰五臟之志過度則勞傷本臟凡五志所傷皆熱也  
所謂陽動陰靜則清平也是故上善若水下愚若火若卒暴僵  
仆多因五志之情過度而卒病也故喜為心火之志病笑者火

之甚也五志過極皆為火也王太僕云君相二火為治之法夫  
病微少者猶入火也遇章而焰得水而燄可以溫伏可以水滅  
逆其性氣折之攻之病之太甚猶龍火也故經曰逆者正治從  
者反治從少從多觀其事也若去五臟六腑之火黃連瀉心火  
黃芩瀉肺火白芍藥瀉脾火知母瀉腎火木通瀉小腸火石膏  
瀉胃火柴胡瀉三焦火黃芩佐之柴胡瀉肝火須黃連佐之膽  
經亦然黃蘗瀉膀胱火又曰龍火膀胱水府之火故也東垣又  
言相火主足太陽少陰之經治以炒黃蘗取其味苦能瀉水中  
之火也此皆苦寒之味能瀉有餘之火耳若飲食勞倦內傷元  
氣火不兩立為陽虛之病治當甘溫之劑除之如黃耆人參甘  
草之屬若陰微陽強相火熾盛以乘陰位日漸煎熬為血虛之  
病以甘寒之劑降之如當歸地黃之屬若心火亢極鬱熱內實  
為陽強之病而以鹹冷之劑折之如大黃朴硝之屬若腎水受

傷其陰失守無根之火為虛炎之病而以壯水之劑制之如生  
地黃玄參之屬若右腎命門火衰為陽脫之病而以溫溫之劑  
濟之如附子乾薑之屬若胃虛過食冷物抑遏陽氣於脾土為  
火鬱之病而以升散之劑發之如升麻乾葛柴胡防風之屬醫  
者若不明此而治火病為難且前人備述其詳全在臨病處方  
庶免實虛之禍也

火證通治方

涼膈散

大黃二斤

連翹四斤

黃芩

薄荷

山梔子

朴硝

甘草

各二斤

右作一服水二鍾入蜜一匙竹葉十片煎至三升沸去粗  
溫服不以時候

黃連解毒湯



黃連

黃蘗

黃芩

大梔子

各一

右作一服水二鍾煎至一鍾食遠服

瀉心湯

大黃

當歸

芍藥

荊芥

麻黃

甘草

各半

白朮

三升

右作一服水二鍾生薑三片薄荷少許煎至一鍾去粗不

拘時溫服

八正散

大黃

瞿麥

篇蓄

車前子

木通

山梔子

甘草

各一

滑石

二升

加木香

加一升

右作一服水二鍾燈心二十莖煎至一鍾不拘時溫服

三黃丸

大黃

黃芩

黃蘗

上各等分

右為末滴水為丸如梧桐子大每服三十丸熟水下又方

去黃芩用黃連

芍藥蘗皮丸

芍藥

黃蘗

去皮各當歸

黃連

各半

右為末滴水為丸如梧桐子大每服三十丸熟水下食前

大金花丸

黃連

黃蘗

黃芩

大黃

各等分

右為末滴水為丸如梧桐子大每服三十丸新水下加梔

子減大黃名梔子金花丸

清涼飲子

大黃

赤芍藥

當歸

甘草

各二兩

右作一服水二鍾煎至一鍾去粗溫服

黃連清心湯

即涼膈散加黃連半兩

犀角散

犀角 鎊

黃連

大黃

芍藥

甘草 各二錢半

右作一服水二鍾煎至一鍾去粗溫服無時

黃連木通丸 治心經蓄熱夏至則甚

黃連 二兩 木通 一兩半

右爲末用生薑汁煮糊爲丸如梧桐子大每服三十九食後用燈心湯下日三服

太醫院經驗奇効良方大全卷之八

太醫院經驗奇効良方大全卷之九

傷寒門

附論

傷寒之爲病經曰冬傷於寒春變爲溫病夏變爲熱病皆係六淫之邪併爲四氣四氣者風寒暑濕是也其氣互交最能傷人風寒之性暴傳六經暑濕之性偏著五臟壯者氣行則已怯者則著成病若風寒傷人先入皮毛肺之外候肺主氣上通於鼻下連膀胱皮毛客邪肺先受害肺虛與邪相拒則病生焉肺實邪無所容其邪勿能爲害病若中者始傳膀胱屬足太陽之經邪入其經相連於肺故右手脉浮弦而洪令人毫毛畢直皮膚閉而爲熱身疼頭痛氣逆喘嗽風傷者自汗惡風寒傷者無汗惡寒且太陽爲州都之官不能自禦治之以藥藥不勝邪雖汗不解邪氣留連必奪穀味豈不虧於皮胃邪氣乘虛入胃屬足陽明之經主肌肉依鼻終於目故身熱目痛鼻乾不眠病自太

陽而傳陽明或猶有惡寒者知邪尚在太陽傳過未盡尤宜汗  
解若不惡寒反欲嘔吐煩躁脈數急者其邪盡在陽明津溢先  
竭胃實乾燥大便難宜以蕩滌其邪邪去脈靜知不傳經而安  
矣設若蕩滌未盡邪留於胃胃者倉廩之官倉廩既虛榮衛失  
養經絡已衰不能勝邪傳入於膽屬足少陽之經循耳絡於脇  
令人脇痛耳聾口苦咽乾往來寒熱而嘔邪毒在裏而不在外  
也依法治之如或不解膽者中正之官而無果決任邪留移於  
脾屬足太陽之經絡於咽喉令人咽乾腹滿時痛手足微冷或  
自利不渴脾虛受邪則爲內寒溫助脾元實倉廩使正勝邪衰  
獲安矣或治不當而邪勝正又傳入腎屬足少陰之經其絡勝  
於繫舌本貫肝入肺其性惡燥故渴引飲邪自三陽而傳少陰  
已經汗下津液枯竭令人口燥舌乾而渴虛者宜溫甚者攻之  
腎者作強之官不能自持而傳於肝屬足厥陰之經絡舌本循

陰經榮於筋謂之厥陰厥者盡也三陰三陽至此盡矣肝者將軍之官不能與邪相抗至使六經傳盡邪毒入深榮衛失調經絡已廢以致手足厥冷則筋急囊縮六經傳遍戰汗而解者或不戰不汗出而解者或六七日不解者又復再傳其病已危又有兩感傷寒者蓋緣未稟雙傳臟腑俱病爲難治也一日太陽與少陰俱病則頭痛舌乾煩滿而渴二日陽明與太陰俱病則腹滿身熱不食譫語三日少陽與厥陰俱病則耳聾囊縮水漿不入不知人者六日而危殆矣謂其三日六經俱病榮衛不行內外臟腑不相通於上下至於六日之氣皆絕故不治而死矣論曰人生天地之間藉氣血以全真原故天無一歲不寒暑人無一日不憂苦故有天行瘟疫之病且傷寒冬令爲殺厲之氣善調攝者嚴寒之時行住坐卧護身周密不犯寒毒或房勞之人辛苦之徒當陽閉藏而反擾動致使斯病而作治傷寒之法

始自漢張仲景分六經之相傳定汗吐下之三法在表宜汗在裏宜下在上吐之半表半裏和解之當汗反下當下反汗變證百端不可盡述又云桂枝下咽陽盛則斃承氣入胃陰盛乃亡焉釐之差失之千里正所謂實實虛虛損不足益有餘如此死者醫殺之耳全在乎識經絡明表裏別虛實用藥則庶幾不差矣此則言其大畧所有六經傳變之藥當以傷寒書中求之

### 傷寒通治方

桂枝湯 傷寒中風病頭痛發熱汗出惡風者

桂枝

芍藥

各二錢半

甘草

炙三錢

右作一服水二鍾生薑五片紅棗二枚煎一鍾不拘時服

麻黃湯

傷寒病頭痛發熱身疼惡風無汗而喘者

麻黃三錢

桂枝二錢

杏仁去皮尖

甘草

炙一錢

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時服

麻黃桂枝各半湯

麻黃去根

桂枝

芍藥去根

甘草炙二

杏仁去皮尖

右作一服水二鍾生薑五片大棗二枚煎一鍾不拘時服

柴胡桂枝湯 治傷寒六七日發熱微有惡寒表證未解者

柴胡三錢

芍藥二錢

桂枝去皮

甘草炙

黃芩絡半

半夏三分

人參一錢

右作一服水二鍾生薑五片大棗二枚煎至一鍾食遠服

升麻葛根湯 治大人小兒時氣瘟疫頭痛發熱及瘡疹已發

未發皆可服

升麻

芍藥

甘草各二錢

葛根三錢

右作二服水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時服

柴胡升麻湯 治時行瘟疫壯熱惡風頭痛體疼鼻塞咽乾咳嗽



嗽涕滋稠粘

柴胡去苗

乾葛

荆芥去梗

赤芍藥

石膏各半

前胡去苗

升麻

桑白皮

黃芩各

右作一服水二鍾生薑三片豆豉二十粒煎至一鍾不拘

時服

葛根解肌湯 治傷寒頭疼發熱惡寒肢體拘急胃膈煩悶

葛根三

麻黃二

肉桂

甘草炙

黃芩

芍藥各一

右作一服水二鍾生薑三片紅棗一枚煎一鍾不拘時服

葛根葱白湯 治感風熱頭疼不止

葛根

芍藥

知母各二

川芎三

右作一服水二鍾生薑七片蔥白五根煎一鍾不拘時服

小柴胡湯 治傷寒七熱如瘵胸膈滿痛小便不利大便澀

柴胡三升 人參 黃芩各二升 半夏一升

甘草一升

右作一服水二鍾生薑三片紅棗二枚煎一鍾不拘時服

大柴胡湯 治傷寒十餘日不解邪熱結不裏身熱煩燥語言

謔妄大便不通選臍刺痛

柴胡二升 大黃三升 枳實一升 芍藥

黃芩二升 半夏二升

右作一服水二鍾生薑五片紅棗一枚煎至一鍾食遠服

柴胡飲子

柴胡去蘆 人參去蘆 黃芩 當歸

芍藥 甘草各一升半 大黃二升

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時服

黃連解毒湯

治傷寒雜病熱毒煩悶乾嘔口燥呻吟喘滿

陽厥極深畜熱於內傳為陰毒並皆治之

黃連

黃蘗

黃芩

山梔冬二

右作一服水二鍾煎至一鍾如腹滿嘔吐或欲作利者加半夏三枚生用厚朴二錢茯苓二錢生薑三片煎熱服名曰半夏黃連瀉心湯

小青龍湯

治傷寒表證不解心下水氣乾嘔發熱咳嗽

微喘又治肺經受寒咳嗽喘急

干夏

湯洗七次

乾薑炮

細辛

去葉

麻黃

去根

肉桂

去皮

芍藥各半

甘草

各一

五味子五分

右作一服水二鍾煎至一鍾下拘時服

大青龍湯

治傷寒頭痛發熱惡寒無汗燥煩六脈浮緊

麻黃

去節

石膏各三

杏仁

各五

甘草

桂枝格一

大棗五箇

生薑

半斤

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

小承氣湯

治傷寒潮熱譫語大便六七日不通有燥糞結滯此藥主之

大黃五斤

厚朴三斤

枳實二斤

右作一服水二鍾煎至一鍾食前服

大承氣湯

治陽明裏熱大便五六日不通日晡潮熱譫語煩燥發渴

大黃

厚朴

三斤

枳實

芒硝

二斤

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾食前服

三乙承氣湯

治傷寒雜病內外所傷日數遠近腹滿咽乳煩渴譫妄心下按之硬痛小便赤澀大便結滯或濕熱內

甚而為滑泄熱甚喘咳悶亂驚悸狂癲目疾口瘡舌腫喉

痺癰瘍陽明胃熱發斑脉沉可下

大黃

厚朴

枳實燒沙

芒硝各二

甘草二升

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時服

調胃承氣湯

治傷寒不惡寒但熱十餘日過經譫語當和

胃氣

大黃

五升

甘草

三升

芒硝

半升

右作一服水二鍾煎至一鍾食前服

桃仁承氣湯

治傷寒蓄血熱結膀胱其人如狂但小腹結

血下者愈

桃仁

去皮

甘草

絡一

芒硝

二升

大黃

四升

右作一服水二鍾煎至一鍾食前服

甘草瀉心湯

治傷寒醫反下之并自利心下痞硬嘔心

煩不安

甘草三斤

乾薑二斤

黃芩

黃連

人參

半夏各半

右作一服水二鍾生薑三片紅棗三箇煎一鍾不拘時服

大黃連瀉心湯

治傷寒大下後復發汗心下痞按之濡

其脉關上浮者不可下宜此藥攻其痞

大黃

五斤

黃連

三斤

黃芩

二斤

右作一服水二鍾煎至一鍾食遠服

半夏瀉心湯

治心下痞滿而不痛乳嘔者

半夏

湯洗七次

人參

去芦

甘草

炙

乾薑

炮

黃芩

各二斤

黃連

一斤

右作一服水二鍾生薑五片紅棗二箇煎一鍾不拘時服

附子瀉心湯

治心下痞而後惡寒汗出者

大黃五斤

黃連

黃芩各二

附子

包去皮臍切作四塊止用一泥

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

生薑瀉心湯

治傷寒汗出後胃中不和心下痞鞭噫氣臭

脇下有水氣腹中雷鳴下利者

生薑

黃芩

人參去芦

乾薑炮各

半夏湯洗

黃連各一

大棗三枚

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

白虎湯

治傷寒脉浮滑者表裏有熱若汗下吐後七八日

不解熱結在裏大渴舌上乾燥欲飲水者

知母三斤

石膏五斤

甘草一斤

粳米半合

右作一服水二鍾煎至一鍾食遠服

白虎加人參湯

又名化斑湯

治傷寒發斑口燥煩渴

知母 三斤

石膏 五斤

人參 二斤

甘草 一斤

右作一服水二鍾粳米一百粒煎至一鍾不拘時服

五苓散

治發汗後胃中乾煩燥不得眠渴欲飲水脈浮小

便利者

澤瀉 三斤

猪苓

茯苓

白朮 各一斤

官桂 去皮

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

猪苓湯

治陽明病脈浮發熱渴欲飲水小便不利或下利

咳而嘔心煩不眠者

猪苓

茯苓

阿膠

澤瀉

滑石 各二斤

右作一服水二鍾煎至一鍾食遠服

四逆湯

治傷寒大下汗後自利清穀身疼痛不渴四肢拘



急手足厥冷軋嘔腹滿脉沉者

甘草

乳薑

附子

右作一服水二鍾煎至一鍾食遠服

四逆散

少陰病四逆其人或咳或悸小便不利腹中痛或

洩利下重者

甘草

柴胡

枳實

芍藥

右作一服水二鍾煎至一鍾食遠服欬者加五味子乳薑

各一錢半下利悸者加官桂一錢半小便不利者加茯苓

一錢半腹中痛者加炮附子一錢半泄利下重用薤白二

十根同煎服

通脉四逆湯

治少陰病下利清穀裏寒外熱手足厥逆脉

微欲絕身反不惡寒面赤或腹痛或乾嘔或咽痛或下利

脉不出者

甘草二斤

乾薑三斤

附子生用

右作一服水二鍾煎至一鍾食遠服面赤者加連翹葱白三根腹痛者去蔥加芍藥二錢嘔者加生薑二錢半咽痛者加桔梗二錢下利脉不出者去桔梗加入參二錢半當歸四逆湯 治手足厥寒脉細欲絕者

當歸

桂枝

芍藥

細辛各二斤

通草

甘草各一斤

右作一服水二鍾紅棗一枚煎至一鍾不拘時服

真武湯

治傷寒數日已後發熱腹痛頭目昏沉大便自利

小便或利或澁或嘔或咳或已經汗不解仍復發熱心下

忪悸頭目眩暈皆由渴後飲水停留中脘所致並皆治之

白芍藥

三斤半下利者去茯苓便閉者去之

附子

炮一箇切四分止用一分

生薑

三斤

白木二升

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服咳者加五味子三

錢半細辛乾薑各一錢二分半

羌活附子散 治吐利後嘔逆胃寒

羌活半升 附子心二枚 檳榔香炒 乾薑炮 各一升 木香半

右作一服水二鍾煎少許煎至一鍾不拘時服

咳逆灸法 治男子婦人傷寒咳逆

其法婦人屈乳頭向下盡腰骨間是穴男子乳小以一指

為率男左女右直間陷中動脉是穴艾炷如小豆大灸三

壯

陽毒升麻湯 治陽毒赤斑狂言咽痛

升麻 犀角 射干各二升 黃芩二升

人參 甘草各一升

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

梔子豆豉湯

治發汗吐下後虛煩不得眠反發顛倒心中

懊懣此藥主之

肥梔子

四箇香豉半升

右作一服水二鍾先將梔子煎至八分入豉同煎至七分

不拘時服

梔子仁湯

治發斑煩燥面赤咽痛潮熱

梔子仁

赤芍藥

大青

知母

升麻

杏仁各一

黃芩半升

石膏二升

柴胡二升

甘草

右作一服水二鍾生姜五片三豉五十粒煎至一鍾不拘

時服

枳實梔子湯

治大病瘥後勞復者

枳實三升

枳實三升

豆豉三升

右作一服青漿水二鍾至一鍾不拘時服如有宿食者

加大黃三升煎服

枳實烏梅湯

治傷寒後不得眠

枳實

枳實

柴胡三升

甘草一升

烏梅三升

右作一服水二鍾生薑三片竹葉十四片豆豉三十粒煎

至一鍾不拘時服

竹葉石膏湯

傷寒解後虛羸少氣上逆欲嘔而渴

淡竹葉

三十石膏三升

麥門冬三升半夏一升

人參

甘草各半

右作一服水一鍾生薑三片粳米一撮煎一鍾不拘時服

人參石膏湯

治傷寒咳嗽不止心煩及風熱頭疼精神不

利腎慎宜服

人參各一

石膏一升

半夏湯泡

枳子仁

黃芩各一

川芎

白朮

茯苓去皮

知母各一

甘草炙二

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時服

旋覆代赭湯 治傷寒發汗吐下解後心下痞硬噎氣不除

旋覆花

代赭石

半夏湯泡

人參各二

甘草炙一

右作一服水二鍾生薑十片紅棗七箇煎一鍾不拘時服

茵陳湯 治陽明裏熱極甚煩渴飲水不飲以致濕熱

相搏而身發黃疸但頭汗出身無汗小便不利渴飲水漿

身必癢黃宜茵陳湯調五苓散利大小便

茵陳去沫

黃芩二升

大梔子五箇

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服以利為度

玄參升麻湯 治傷寒失下熱毒在胃發斑甚則煩燥譫語

玄參

升麻

甘草炙

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

抵當湯 太陽病六二日表證仍在脉微而沉反不結胸其

人發狂熱在下焦小腹硬滿小便自利而狂大便黑色為

有血也當下瘀血宜服之

大黃

酒洗

水蛭

十枚炒去子碎用石灰炒紫黃色去灰不用只宜多炒為妙

蟅蟲

十箇去

桃仁

七箇去尖

右作二服每服水二鍾煎至七分不拘時服

抵當丸

治傷寒有熱小腹滿痛小便不利今反利為有血

也當下其血

大黃

三升

水蛭

七枚炒去子碎用石灰炒入石及再炒去灰

蜜蠟

此藥去

桃仁

去尖

右為末水和作一丸水一大鍾煎至七分不拘時頓服以利下血不可再服

犀角地黄湯

治血證大便黑痢後脈微癸在發黃當汗不

汗內有瘀血

犀角

如無并

生地黄

牡丹皮

芍藥

各二

右作一服水二鍾煎至一鍾食後服

小建中湯

傷寒陽脉濇陰脉弦腹中急痛二三百心中悸

而煩自汗者

芍藥

三

桂枝

甘草

各二

膠飴

一

右作一服水二鍾生薑五片棗一枚煎至一鍾去粗下膠

飴再煎化不拘時服

大陷胃湯

傷寒大陽表證未解胃下之結胃胸實心下



痛按之石硬脈沉而緊者

大黃七斤

芒硝一斤

芒硝三斤

右作一服水二鍾先煎大黃至一鍾去粗下硝再煎一沸下其遂末不拘時服快利為度

小陷胃湯

心結胃病心下痞滿而軟按之則痛臑浮滑者

半夏五升

黃連二斤

枳實三斤

右作一服水二鍾先煮枳實至一鍾半後入諸藥煎至一

鍾不拘時服

陷胃丸

病發於陽而反下之熱入因作結胃者項亦強如

柔瘕狀下之則和

大黃二斤

杏仁去尖芒莖炒

芒硝各七

右先將大黃煎熟二味為末後研杏仁芒硝為泥入前藥末和令勻丸如彈子六每服一九抄甘遂末半錢白蜜平

兩水二盞煮取一盞不拘時頓服一宿乃下如不下再服  
其遂性猛宜斟酌量服之

五味子湯

治傷寒喘促脉伏而厥及汗下後氣閉咳血

五味子

二升

麥門冬

二升

知母

三升

杏仁

一升

皮尖

陳皮

二升

右作一服水二鍾生薑七片紅棗三箇煎一鍾不拘時服

溫膽湯

治傷寒瘧後調理

半夏

湯泡

茯苓

去皮

陳皮

去白

枳實

炒

甘草

半升

竹茹

一升

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時服

加味溫膽湯

治心膽虛怯觸事易驚夢寐不安氣鬱生涎

涎與氣搏變生諸證以短氣困乏或復自汗四肢浮腫飲

食無味心虛煩悶坐卧不安

枳實 麩沙

半夏 湯泡

白茯苓 去皮 橘紅

人參 各半

竹茹

香附

麥門冬

柴胡

桔梗 各一

甘草 半条

右作一服水二鍾生薑三片紅棗二枚煎一鍾不拘時服

桂枝附子湯

治傷寒八九日不能風濕相搏身軀煩疼

桂枝 三斤

附子 炮去皮 甘草 二斤

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時服活人書

有考藥大棗

茯苓四逆湯

治傷寒汗下之後病證不解而煩燥者

茯苓 去皮

人參 去蘆

乾薑 各半 甘草 三

附子 去皮生

只用一片切

石作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

人參敗毒散

傷寒頭痛壯熱惡寒及風痰咳嗽鼻塞聲

重身體疼痛

柴胡去蘆

川芎一分

前胡去芦

甘草炙

人參去芦

桔梗去芦

羌活去苗

獨活去苗

茯苓去皮

枳殼麩炒

薄荷少許

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服

參蘇飲

治感冒風邪發熱頭痛咳嗽聲重喘喘稠粘此藥

大解肌熱快膈

人參去芦

紫蘇

茯苓去皮

半夏湯洗

前胡去苗

乾薑冬二分

枳殼麩炒

甘草炙

陳皮各一分

桔梗

木香各七分

右作一服水二鍾生薑三片紅棗二枚煎一鍾不拘時服

香蘇散

治四時傷寒頭痛發熱惡寒

香附

紫蘇冬三分

陳皮二分

甘草一分

右作一服水二鍾生薑五片葱白三根煎至一鍾不拘時服如頭痛甚者加川芎白芷名考芷香蘇散

消風百解散 治四時傷寒頭眩發熱及寒壅咳嗽鼻塞聲重

荆芥 白芷 陳父 麻黃去根

蒼朮移二 甘草移一

右作一服水二鍾生薑三片葱白三根煎至一鍾不拘時服如咳嗽加烏梅煎

升味和解散 治頭疼發熱發散風邪

白朮二 桔梗去苗 人參去芦 甘草炙

陳皮去白 枳殼去穢 赤芍 厚朴薑製

當歸移一 防風去分

右作一服水二鍾生薑三片葱白三根煎一鍾不拘時服

十味芩蘇散 治四時傷寒發熱頭疼

川芎二升

紫蘇

桔梗去節

柴胡去苗

茯苓去皮

半夏

枳殼

陳皮去粗

乾葛半升

甘草各半

右作一服水二鍾生薑三片紅棗二枚煎一鍾不拘時服

金沸草散 治肺經受風頭目昏痛咳嗽聲重涕唾稠粘及治

時變寒熱

金沸草

前胡

甘草炙各一升

麻黃去節

芍藥各半

荆芥穗

半夏各二升

右作一服水二鍾生薑三片紅棗二枚煎一鍾不拘時服

十神湯 治傷寒時令不正痲疫妄行感冒發熱或欲出疹不

問陰陽兩感風寒並皆治之

川芎

麻黃去節

乾葛

紫蘇

赤芍藥

升麻

白芷

甘草炙

陳皮

香附冬半

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服發熱頭

疼加連翹葱白二根中滿氣急加枳殼煎

藿香正氣散 治傷寒頭疼吐寒壯熱或感濕氣霍亂泄瀉常

服除山嵐瘴氣

藿香

二升

紫蘇

去梗半

厚朴薑製

茯苓

去皮

陳皮

白芷

半夏

湯洗

桔梗

去芦

大腹皮

白朮

各一

甘草

炙

白朮

各一

右作一服水二鍾生薑五片紅棗二枚煎一鍾不拘時服

不換金正氣散 治四時傷寒瘟疫時氣及山嵐瘴氣寒熱往

來霍亂吐瀉下痢赤白並宜服之

方見寒門

鑒導煎法 陽明病自汗出若發汗小便自利者為津液內竭

雖硬不可攻之若大便不去者宜蜜導煎以通之

右用蜜四兩銅器中微火煎之稍凝如飴攪令赤色勿令焦欲可丸手捻作錠令頭銳大如指長二寸許性熱一時難凝急於冷處放必硬納於穀道中以手急按之一時大便出乃去之

猪膽汁 治證同前

右用大猪膽一箇瀉汁同和醋少許灌入穀道中頃時大  
便行

黃芩湯 治傷寒自利多熱者

黃芩 四錢

芍藥

甘草 三錢

右作一服水二鍾紅棗一箇煎至一鍾不拘時服

桃花湯 治傷寒下痢膿血

乾薑 三錢

赤石脂 七錢



右作一服水二鍾糯米一撮煎至一鍾不拘時服

桔梗湯 治傷寒咽痛

桔梗五錢 甘草三錢

右作一服水二鍾煎至一鍾食後服

赤石禹餘糧湯 治傷寒下痢不止熱在下焦

赤石脂 禹餘糧各四錢

右作一服水二鍾煎至一鍾不拘時服

大半夏湯 治傷寒膈間有寒痰

半夏湯洗 茯苓各三錢

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服